

**HERBICIDA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**N° de Registro: 4979**

**Titular del Registro: ANASAC DOMINICANA**

**País: REPÚBLICA DOMINICANA**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**

**DIFLUFENICAN ..... 50,00% m/v**

**Ingredientes inertes ..... 73,00% m/v**

**GENERALIDADES**

**YOGA® 50 SC** es un herbicida selectivo, de contacto y residual. Absorbido por brotes de semillas en germinación y recomendado para el control en pre-emergencia y post-emergencia temprana de malezas gramíneas y hoja ancha.

**RECOMENDACIONES DE USO**

| CULTIVO                          | PLAGA                                                | DOSIS          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arroz<br>( <i>Oryza sativa</i> ) | Falsa caminadora<br>( <i>Ischaemum rugosum</i> )     | 0,5 – 0,6 L/ha | <p>Aplique el producto en 200 litros de Agua por hectárea. Utilice la dosis baja para suelos de texturas livianas, y la dosis alta para suelos de texturas pesadas.</p> <p>Aplicar en las especies de maleza descrita en la etiqueta hasta con un máximo de tres hojas visibles.</p> |
|                                  | Paja mona<br>( <i>Leptochloa virgata</i> )           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Liendre puerco<br>( <i>Echinochloa colonum</i> )     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Guarda rocío<br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> )     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Pata de gallina<br>( <i>Eleusine indica</i> )        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Caminadora<br>( <i>Rottboellia cochinchinensis</i> ) |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Paja peluda<br>( <i>Paspalum pilosum</i> )           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Botón blanco<br>( <i>Eclipta prostrata</i> )         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Verdolaga<br>( <i>Portulaca oleracea</i> )           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Clavo de agua<br>( <i>Ludwigia linifolia</i> )       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Cortadera<br>( <i>Cyperus iria</i> )                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Barba de indio<br>( <i>Fimbristylis miliacea</i> )   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**EQUIPO DE APLICACIÓN:**

La aplicación terrestre puede hacerse con tractor, aspersora manual o equipo de motor. Debe asegurarse que los equipos y boquillas estén en buen estado y calibrados para una buena distribución y tamaño de la gota uniforme. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de pvc, máscara, antiparras, guantes y botas.

**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. Durante la manipulación del producto usar delantal impermeable, protector facial, guantes y botas. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.

**RANGO pH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCIÓN: 5 – 7.**

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Una aplicación en pre- emergencia o post-emergencia temprana.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:** Dada la época de aplicación, no existe restricción de tiempo entre la aplicación y la cosecha.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Se recomienda 12 horas antes de reingresar a las áreas tratadas o realizar cualquier labor en las mismas.

**FITOTOXICIDAD: YOGA® 50 SC** es totalmente selectivo a los cultivos recomendados, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** No se debe mezclar con productos de reacción fuertemente alcalina. En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer pruebas de fitocompatibilidad.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Los usuarios del producto, deben lavarse bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Lavar abundantemente después de usar. No trabajar en la neblina del líquido o con viento. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado de equipo de aplicación, use la ropa de protección: sombrero, protector de ojos, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evite aspirar la llovizna de aspersión. Bañarse con suficiente agua y jabón después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia. Use ropa limpia en cada jornada de trabajo. No lave la ropa de trabajo y equipo de protección junto con la ropa de uso normal.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico.

No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y los alimentos domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Irritación ocular, tos, rinitis y dificultad respiratoria, especialmente en personas asmáticas. Náuseas, vómitos, diarrea, daño hepático.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** De a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado dele clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:**

Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario, si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto especialmente en los cuadros severos, hasta que el agua salga sin olor al tóxico. Luego administrar carbón activado a dosis de 1 g/Kg de peso en los adultos y 0,5 g/Kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea). Mantener una correcta hidratación por vía oral o parental, garantice adecuada circulación y ventilación.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

En caso de intoxicación llamar a:

| PAÍS                 | INSTITUCIÓN                                                     | TELÉFONOS                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Belice               | Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital         | (501) 223-1548                             |
| Costa Rica           | Centro Nacional para el Control de Intoxicaciones               | (506) 223-1028                             |
| El Salvador          | Centro de Información y Asesoría Toxicológica                   | (503) 2231-9262                            |
| Guatemala            | Centro de Información y Asesoría Toxicológica                   | (502) 223-20735                            |
| Honduras             | Hospital Escuela                                                | (504) 223-22322                            |
| Nicaragua            | Centro Nacional de Toxicología de Nicaragua                     | (505) 228-94700<br>Ext.1294, cel: 87550983 |
| Panamá               | Centro de investigación e información de Medicamentos y Tóxicos | (507) 269-2741                             |
| República Dominicana | Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones             | 1-809) 985 6560<br>(1-809) 480 4399        |
|                      | Dr. Jesús Boadas                                                | (1-849) 657 0709                           |

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

En caso de derrames, aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.

**NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DRENAJE.**



**ELIMÍNESE LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO Y SUS RECIPIENTES CON TODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLE.**

**ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y SU RECIPIENTE COMO RESIDUOS PELIGROSOS.**

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos lávelos con agua, destrúyalos perforándolos para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, trasladar a la empresa distribuidora, quien se encargará de remitir al centro de acopio.

Aplicar TRIPLE LAVADO a los envases utilizados. Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos y medio ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío, hasta la cuarta parte de su capacidad, taparlo y agitarlo por 30 segundos. Luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse dos veces más. Después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

**Importado y distribuido por:**

**Titular del registro:**

**ANASAC DOMINICANA S.R.L**

Av. 27 de Febrero # 261, Plaza APH, suite 29,  
Ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito  
Nacional, República Dominicana.

**ATENCIÓN**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MAS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA O EL PANFLETO. COMUNIQUESE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN DE DROGAS Y DE INTOXICACIONES (1-809) 985 6560 / (1-809) 480 4399, O CON LA INSTITUCIÓN DR. JESÚS BOADAS (1-849) 657 0709**

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.**  
**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**  
**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**  
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**  
**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**  
**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL**

El fabricante garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto, ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones



ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el mal uso y mal manejo del producto que está adquiriendo y se compromete a almacenarlo en las condiciones que la etiqueta sugiere. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis, considerando las tolerancias de residuos y siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

El uso reiterado de ingredientes activos con el mismo modo de acción puede generar el desarrollo de resistencia por parte de los organismos tratados, impidiendo o dificultando así su adecuado control. Dado lo anteriormente señalado es importante considerar dentro de una estrategia de control, productos que alternen su modo de acción. La empresa no se hace responsable por una falta de control dada por el desarrollo de resistencia. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o al especialista de su confianza.