



HERBICIDA
POLVO MOJABLE (WP)
N° de Registro: 72-H6/NA
Titular del Registro: AGROCHILE S.A.
País: ECUADOR

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

METSULFURON METHYL 500 g/kg

Excipientes c.s.p 1 kg

GENERALIDADES

METSUL es un herbicida del grupo de las sulfonilureas, recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha. Actúa en forma sistémica y residual, siendo absorbido por el follaje y el sistema radicular, para ser translocado a toda la planta. **METSUL**, controla malezas presentes como aquellas por emerger.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS g/ha	PC
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Arrocillo (<i>Fimbristylis littoralis</i>) Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>)	8	No aplica
Pasto Saboya (<i>Panicum maximun</i>)	Centavito (<i>Dichondra repens</i>) Oreja de ratón (<i>Geophila macropoda</i>) Kudzú tropical (<i>Pueraria phaseoloides</i>) Escoba dura (<i>Sida rhombifolia</i>) Amor seco (<i>Desmodium adscendens</i>)	18	No aplica

*Volumen de agua: Arroz: 200 litros/ha; Pasto saboya: 100 litros/ha.

MODO DE EMPLEO:

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la cantidad necesaria de **METSUL**, luego adicionar otro herbicida en caso de realizar mezcla. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

ARROZ, se puede aplicar junto a un graminicida, Post emergencia: Aplique entre los 15 y 35 días después de la germinación del cultivo, con malezas de hasta 7 hojas y/o 10 – 15 cm de altura. No aplicar más de una vez por temporada de cultivo.

PASTO SABOYA, cuando las malezas tengan de 3 a 5 hojas verdaderas, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en malezas. Se aplica una vez cada 21 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 0 horas para ingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: No compatible con productos de pH menores a 4 y mayores a 9.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Metsulfuron methyl: Sulfunilurea.

En caso de inhalación: Mantenga el paciente calmado, mueva al aire libre, busque la atención médica.

En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante agua y jabón, busque la atención médica.

En caso de contacto con los ojos: Lave los ojos afectados al menos 15 minutos bajo agua corriente con los párpados abiertos, consulte a un oftalmólogo.

En caso de ingestión: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL". Llevar inmediatamente al centro asistencial. Trasladar al paciente al hospital más cercano y en lo posible lleve la etiqueta o el envase del producto.

SINTOMAS, TRATAMIENTO y ANTÍDOTO ESPECIFICO: No hay un antídoto específico. Se recomienda un tratamiento sintomático apropiado según la condición del paciente.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE".

"NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO".

"NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y entréguelo al gestor autorizado para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Muy tóxico para los organismos acuáticos" "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". Respete una franja de

seguridad terrestre mínima de 50m sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

Importado y distribuido por:**FARMAGRO**

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38C MZ. 263.

Tel: (042) 590 600 Fax: ext. 172

Titular del registro:**AGROCHILE S.A.**

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.

Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORIA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Teléfono: (022) 6020273

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

ATENCIÓN**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.