

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TEMPANO®

INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Imidacloprid	228 g/kg
Lambda-cyhalothrin	100 g/kg
Excipientes	c.s.p 1 kg

Registro Nacional: 151 – I3 / NA

Titular del Registro: AGROCHILE S.A.

Valderrama N31-27 y Av. Mariana de Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito, Ecuador.
Tel: 6020273 Email: agrochile@anasac.cl

Formulado por:



ANASAC CHILE S.A.

Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: 562-24706800
Fax: : 562-24869100

Importado y Distribuido por:



El compadre del agro

Ciudadela Los Vergeles calle 23 a Dr. Carlos Julio
Arosemena N° 1-6-7 intersección av. 38 C MZ. 263
Teléfono: (042) 590 600 Fax: ext. 172

**Zhejiang Longyou East Anasac
Crop Science Co., Ltd.**

Town South Donghua District, Longyou County.
Zhejiang China
Tel: +86-(0)570-7855158

CONTENIDO NETO:

Lote No.:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento:

P.V.P.:

**Nocivo en caso de Ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.**

**Muy tóxico para organismos
acuáticos.**



PELIGRO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala; Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa. Cuidado, evite el contacto (Neurotóxico). Causa daño temporal a los ojos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUIMICO: Imidacloprid: Neonicotinoide. Lambda-cyhalothrin: Piretroide

En caso de INHALACIÓN: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de CONTACTO CON LA PIEL:** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. **En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de INGESTIÓN:** no induzca el vómito.

SÍNTOMAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Ante contacto se puede presentar prurito y en la cara una sensación de quemadura y adormecimiento. En personas muy sensibles se puede presentar alergia. En caso de inhalación se puede presentar irritación que se manifiesta con tos, rinitis, dificultad respiratoria, oclusión nasal, rinorrea y sensación de aspereza en la garganta y una posible disminución de la capacidad respiratoria. En caso de ingestión se puede presentar náuseas, vómitos, cólico, tenesmo (deseo doloroso de defecar) y diarrea.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico. Suministre tratamiento sintomático y de recuperación general. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta".

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES"

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: "En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda".



EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día ó al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. "Después de usar el contenido, inutilice cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

"Muy tóxico para organismos acuáticos" "No contaminar ríos, lagos, estanques o fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de aspersión como al eliminar los residuos". "Respete una franja de seguridad mínima tanto para aplicaciones aéreas y terrestres de 60 y 50 m respectivamente sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: TEMPANO® es una mezcla de dos insecticidas pertenecientes al grupo de los neonicotinoides y piretroides por lo que se obtiene la acción sistémica del Imidacloprid con la potente acción de contacto del piretroide Lambda-cyhalothrin ideal para obtener el control de chupadores y de masticadores.

MODO DE EMPLEO: Ponga agua hasta la mitad del tanque, agregue la cantidad recomendada de **TEMPANO®**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
TOMATE RIÑÓN (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,20 kg/ha*	21 días
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	0,30 kg/ha*	40 días
ROSA (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1,25 kg/ha*	N/A
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>)	0,20 kg/ha*	30 días

P.C.: Periodo de Carencia **N/A:** No Aplica

*Volumen de agua: Arroz y Tomate: 400L/ha. Rosa: 1100 L/ha. Maíz: 200 L/ha.

RESTRICCIÓN DE USO: Producto a ser utilizado sólo bajo invernadero en cultivo de Tomate.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

TEMPANO® debe ser aplicado sobre plagas, cuando las poblaciones superen el nivel de daño económico dentro del cultivo.

Tomate: Se recomienda para el control de Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*) aplicar **TEMPANO®** cuando se observen las primeras poblaciones de la plaga en ciclos de máximo tres aplicaciones con intervalos de 7 días y rotar con ingredientes activos de mecanismo de acción diferente. **Arroz:** Se recomienda utilizar el producto cuando exista una incidencia del 5 % de la plaga como mínimo en las plantas del cultivo de arroz, rotar con plaguicidas de diferente mecanismo de acción para evitar resistencia. **Rosas:** Aplicar **TEMPANO®** cuando exista la presencia de un (1) insecto por botón, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción, para evitar la formación de resistencia en insectos.

Maíz: aplicar cuando exista un umbral de 1 a 3 insectos adultos por pase de la malla entomológica.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): No reingresar al área tratada 48 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación bajo la responsabilidad del usuario.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA 4: LIGERAMENTE PELIGROSO

