

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**
**Ingrediente Activo:**
**ACETAMIPRID** ..... 100 g/l

**PYRIPROXYFEN** ..... 100 g/l

**Aditivo de importancia toxicológica:**
**Solvent Naphtha** ..... 100 g/l

**Aditivos** ..... c.s.p. 1 l

**GENERALIDADES**

**ANTIPODA** es una mezcla de insecticidas compuesto por: Piriproxifen es un insecticida que afecta la sinapsis en el sistema nervioso del insecto provocando la parálisis y posterior muerte y Acetamiprid afecta sobrecargando el sistema hormonal del insecto afectando la producción de huevos.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	P.C. (Periodo de carencia)
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Mosca Blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0.40	7 días
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	0.25	N/A
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	Paratrioza ( <i>Bactericera cockerelli</i> )	0.20	7 días
Tabaco ( <i>Nicotiana tabacum</i> )	Mosca Blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	0.40	14 días
Tomate de árbol ( <i>Solanum betaceum</i> )	Paratrioza ( <i>Bactericera cockerelli</i> )	0.20	7 días

**Gasto de agua:** Papa: 200 L / ha; Rosa: 1100 L/ha; Tabaco: 400L/ha; Tomate de árbol y Tomate riñón: 600 L/ha.

**MODO DE EMPLEO:**

Ponga agua hasta la mitad del tanque, regulando a ph 5,5, agregar un dispersante de su preferencia y luego agregue la cantidad recomendada de **ANTIPODA**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

Tomate riñón: Se recomienda aplicar con la presencia de la plaga y se puede realizar una aplicación por temporada.

Rosas: Aplicar considerando un umbral económico de un insecto por botón, realizar una aplicación cada 10 días.

Papa: Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días.

Tabaco: Aplicar vía foliar cuando exista un umbral de 5 insectos vivos por planta.

Tomate de árbol: Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** 48 horas para los cultivos de Papa, Rosa, Tabaco, Tomate de árbol y Tomate riñón.

**FITOTOXICIDAD:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Nocivo en caso de Ingestión, Nocivo en contacto con la piel, Nocivo si se Inhala, Causa daño temporal a los ojos, Corrosivo, causa quemadura a la piel, El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico:** Pyriproxyfen: Piridina; Acetamiprid: Neonicotinoide

**En caso de inhalación,** conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

**En caso de contacto con la piel,** retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto con los ojos** lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

**En caso de ingestión:** “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL”.

**SÍNTOMAS:** Fatiga, reducción de la actividad motora, anormalidades al caminar, disminución de temperatura, dilatación de pupilas y una posible disminución de la capacidad respiratoria. Náuseas, vómitos, diarrea y pérdida de electrolitos.

**TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO:** Aplicar tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

**RELATIVAS A LA SEGURIDAD:**

Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

**“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.**

**RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

Muy tóxico para organismos acuáticos. Ligeramente tóxico para abejas. “No aplicar el producto en época de floración” y “No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas” No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. “Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50m y aplicaciones aéreas 60m respectivamente, sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Y una franja de seguridad de 200 metros en el perímetro de los cultivos aledaños a las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano.

**Importado y distribuido por:****FARMAGRO**

**Dirección:** Ciudadela Los Vergeles calle 23  
a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7  
intersección av. C MZ. 263

**Teléfono:** (042) 590 600 **Fax:** ext. 172

**Titular del registro:****AGROCHILE S.A.**

**Dirección:** Valderrama N31-27 y Av. Mariana de  
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3  
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-020273.

Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO**

**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL:** ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: [agrochile@anasac.cl](mailto:agrochile@anasac.cl)

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**PELIGRO**

**RESPONSABILIDAD:**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.