

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**Ingrediente Activo:****ACETAMIPRID** 100 g/l**PYRIPROXYFEN** 100 g/l**Aditivo de importancia toxicológica:****Solvent Naphtha** 100 g/l**Aditivos** c.s.p. 1 l**GENERALIDADES**

ANTIPODA combina dos ingredientes activos con mecanismos de acción complementarios: acetamiprid (IRAC 4A), que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos provocando parálisis y muerte, y pyriproxyfen (IRAC 7C), regulador del crecimiento que altera el desarrollo y la reproducción de los insectos, afectando la eclosión de huevos y la formación de adultos viables.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	P.C. (Periodo de carencia)
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.40	7 días
Rosas (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.25	N/A
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.20	7 días
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.40	14 días
Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Paratrioza (<i>Bactericera cockerelli</i>)	0.20	7 días

Gasto de agua: Papa: 200 L / ha; Rosa: 1100 L/ha; Tabaco: 400L/ha; Tomate de árbol y Tomate riñón: 600 L/ha.

MODO DE EMPLEO:

Ponga agua hasta la mitad del tanque, regulando a pH 5,5, agregar un dispersante de su preferencia y luego agregue la cantidad recomendada de **ANTIPODA**, mezcle lentamente y complete el volumen total con agua. Mantenga la mezcla en agitación durante su preparación y aplicación. Calibre el equipo de aplicación terrestre para dar un gasto de agua según fenología del cultivo, asegurando una buena cobertura.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Tomate riñón: Se recomienda aplicar con la presencia de la plaga y se puede realizar una aplicación por temporada.

Rosas: Aplicar considerando un umbral económico de un insecto por botón, realizar una aplicación cada 10 días.

Papa: Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días.

Tabaco: Aplicar vía foliar cuando exista un umbral de 5 insectos vivos por planta.

Tomate de árbol: Aplicar cuando exista un umbral de 10 ninfas por hoja, realizar aplicaciones cada 10 días.

PERIODO DE REINGRESO: 48 horas para los cultivos de Papa, Rosa, Tabaco, Tomate de árbol y Tomate riñón.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los que se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de usos común. Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión, Nocivo en contacto con la piel, Nocivo si se Inhala, Causa daño temporal a los ojos, Corrosivo, causa quemadura a la piel, El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Pyriproxyfen: Piridina; Acetamiprid: Neonicotinoide

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL”.

SÍNTOMAS: Fatiga, reducción de la actividad motora, anormalidades al caminar, disminución de temperatura, dilatación de pupilas y una posible disminución de la capacidad respiratoria. Náuseas, vómitos, diarrea y pérdida de electrolitos.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTÍDOTO: Aplicar tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

“ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Muy tóxico para organismos acuáticos. Ligeramente tóxico para abejas. "No aplicar el producto en época de floración" y "No aplicar durante horas de polinización o actividad de las abejas" No permita que el producto contamine cuerpos de agua ni el suelo. "Respetar las franjas de seguridad para aplicaciones terrestres 50m y aplicaciones aéreas 60m respectivamente, sin barreras vivas y 30m con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Y una franja de seguridad de 200 metros en el perímetro de los cultivos aledaños a las zonas pobladas, centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y cuerpos de agua destinados para consumo humano.

Importado y distribuido por:**FARMAGRO**

Dirección: Ciudadela Los Vergeles calle 23
a Dr. Carlos Julio Arosemena N° 1-6-7
intersección av. C MZ. 263

Teléfono: (042) 590 600 **Fax:** ext. 172

Titular del registro:**AGROCHILE S.A.**

Dirección: Valderrama N31-27 y Av. Mariana de
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED 231 Piso 3
Oficina 31 S. Quito, Ecuador. Tel: (593) 2-020273.
Email: agrochile@anasac.cl

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas o al Titular del Registro AGROCHILE S.A Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

PELIGRO**RESPONSABILIDAD:**

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".