

Crecitec Max Boro

FERTILIZANTE FOLIAR

LIQUIDO

N° de Registro: 894-F-8285-23

Titular: AGRO-CHILE S.A.

País: GUATEMALA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Boro (B) 15,0% m/v

Fuentes: ácido Bórico.

GENERALIDADES:

CRECITEC MAX B es un fertilizante foliar a base Boro. Desde el punto de vista nutricional aporta Boro (B) además de corregir deficiencias de este elemento durante las etapas de mayor consumo. Debido a la presencia de un complejo alcoholes-azúcares de fácil penetración que confiere buena sistemía, sus elementos son asimilables en su totalidad. **CRECITEC MAX B** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	INSTRUCCIONES DE USO
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	1 – 1,5 L/ha en 200 L de agua, vía foliar. Realizar 3 aplicaciones por temporada.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Aplicar cuando la planta tenga 5 hojas y repetir antes del inicio de floración y cuando la planta presente deficiencias de este elemento.
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Chile (<i>Capsicum annuum</i>)	Aplicar a los 15 días del trasplante, en prefloración, al inicio del desarrollo de frutos y repetir cada 15 días hasta la salida del cultivo.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Aplicar desde el inicio de la formación del tubérculo.
Melón (<i>Cucumis melo</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	Aplicar antes del inicio de floración y repetir entre 15 a 21 días hasta la salida del cultivo.
Frutales y Cítricos (<i>Citrus spp.</i>)	Aplicar antes del inicio de floración y repetir cada 21 a 30 días hasta la salida del cultivo.
Frijol/Ejote (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Aplicar antes del inicio de floración y repetir cada 21 a 30 días.
Col (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>), Coliflor (<i>Brassica oleracea var. Botrytis</i>), Brócoli (<i>Brassica oleracea itálica</i>), Zanahoria (<i>Daucus carota</i>), Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>), Apio (<i>Apium graveolens</i>)	Cuando la planta tenga de 5 a 6 hojas. Hacer una aplicación antes del inicio de la formación de la inflorescencia. Repetir cada 2 a 3 semanas.
Ajo (<i>Allium sativum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Aplicar cuando comienza la formación de bulbo.
Banano y Plátano (<i>Musa x paradisiaca</i>)	Aplicar al inicio de la floración y repetir cada 15 a 21 días.
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)	Aplicación foliar, en caso de historial de deficiencias o análisis foliar que indique carencia, previo flor.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, posteriormente agregue la dosis correcta de **CRECITEC MAX B**, agite nuevamente hasta que se homogenice la mezcla y termine de llenar el tanque, posteriormente hacer la aplicación. El pH óptimo de aplicación es 6,5. Preparación y aplicación. Utilice como protección respiratoria máscara con filtro. Utilice como protección de manos: Guantes de goma impermeables (ej. neopreno, látex). Utilice como protección de ojos: Gafas protectoras. Para manipulación: usar delantal, botas de goma. Para aplicación: usar overol de PVC, botas de goma.

FORMA DE APLICACIÓN:

Realizar 3 aplicaciones por temporada, vía foliar. Dosis de Aplicación: 1 – 1,5 L/ha en 200 L de agua.

INCOMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los plaguicidas que se usan comúnmente. En caso de duda hacer una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se conocen síntomas de fitotoxicidad cuando se aplican las dosis recomendadas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO:

Este producto no debe almacenarse ni transportarse con forrajes, alimentos, medicamentos y utensilios de uso personal o pecuario. Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, en su envase original y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y a la luz, no es corrosivo. El producto es estable por un periodo de dos años. **CRECITEC MAX B** debe ser almacenado en bodega con rangos de temperaturas entre 5 y 30°C. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, evitando la exposición directa a la luz solar.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

SINTOMAS DE INTOXICACION: No presenta ningún síntoma de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Si el paciente está consciente dé a beber suficiente agua. Busque atención médica inmediata.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente la parte afectada con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MEDICO: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto específico.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN (PROTECCIÓN) AL AMBIENTE: Realice el triple lavado inmediatamente después de vaciar el contenido. Vierta el agua de enjuague en el tanque del equipo de aplicación. Perfore o inutilice los envases después del lavado para evitar su reutilización indebida. Almacene los envases vacíos en un lugar techado, ventilado y alejado de alimentos, agua y forraje. Entregue los envases a centros autorizados para su recolección o disposición final. Nunca los queme ni los deseche en el campo. Lave los equipos en zonas designadas para este fin, preferiblemente con sistemas de recolección de aguas contaminadas. Evite el vertimiento directo de aguas residuales a fuentes de agua natural o al alcantarillado. No aplique cerca de fuentes de agua, no contamine lagos, ríos o estanques. En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente e incorpórelo al campo de cultivo.

Titular del registro:

AGRO-CHILE S.A.

PRECAUCIÓN

**¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO.
"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION".
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMESTICOS Y DE LOS ALIMENTOS.
DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO.**

AVISO DE GARANTIA:

El formulador y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. garantizamos el contenido del producto de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado. el usuario asume el riesgo de los daños ocasionados por factores que escapan a la responsabilidad del formulador y adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.