

Crecitec Max

Zinc

FERTILIZANTE FOLIAR

LIQUIDO

N° de Registro: 894-F-8296-23

Titular: AGRO-CHILE S.A.

País: GUATEMALA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Zinc (Zn) 15,0% m/v

Fuentes: Cloruro de Zinc Anhidro.

GENERALIDADES:

CRECITEC MAX Zn es un fertilizante foliar a base Zinc. Desde el punto de vista nutricional aporta Zinc (Zn) además de corregir deficiencias de este elemento durante las etapas de mayor consumo. Debido a su formulación es de fácil penetración y presenta una buena sistemía, sus elementos son asimilables en su totalidad. **CRECITEC MAX Zn** puede ser aplicado vía foliar. Proporciona una elevada respuesta en diferentes cultivos al favorecer procesos metabólicos y fisiológicos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	INSTRUCCIONES DE USO
Frutales	Efectuar 1 a 3 aplicaciones, a partir de puntas verdes.
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Efectuar 1 a 2 aplicaciones, antes de floración.
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Aplicar antes de floración y durante la formación de vainas.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Aplicar la dosis baja al aparecer la espiga. Aplicar la dosis alta con mayor volumen de agua en caso de deficiencias severas.
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	De 10 a 15 días después del trasplante. Repetir cada 15 días durante desarrollo vegetativo hasta antes de la floración.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Aplicar 15 días después de la emergencia y repetir cada dos semanas hasta la formación del tubérculo.
Melón (<i>Cucumis melo</i>), Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	De 10 a 15 días después del trasplante. Repetir cada 15 días durante desarrollo vegetativo hasta antes de la floración.
Ajo (<i>Allium sativum</i>), Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	1ª aplicar 15 días después de emergencia y/o trasplante, una 2ª a las dos semanas y una 3ª al inicio del desarrollo del bulbo.
Banano y Plátano (<i>Musa x paradisiaca</i>)	Aplicar al presentarse deficiencias de zinc.
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Aplicar a los 30 y 60 cm de altura.
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)	Aplicación foliar desde 8 pares de hojas verdaderas hasta pre flor, cada 14-21 días continuar tratamientos, si es necesario, después de cuaja con el propósito de alargar follaje.
Maíz (<i>Zea mays</i>)	1 a 2 L/ha. aplicar foliarmente desde segundo par de hojas hasta previo flor en caso de deficiencias severas y apuntando a desarrollo vegetativo y luego, en post cuaja hasta pre cosecha para mejorar llenado de granos.
Café (<i>Coffea arabica</i>)	1 a 2 Lt /ha. aplicar al follaje en época de pre y post floración, además durante el desarrollo hasta pinta y post cosecha antes de que la hoja devuelva todos sus nutrientes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, posteriormente agregue la dosis correcta de **CRECITEC MAX Zn**, agite nuevamente hasta que se homogenice la mezcla y termine de llenar el tanque, posteriormente hacer la aplicación. El pH óptimo de aplicación es 6,5. Preparación y aplicación. Utilice como protección respiratoria máscara con filtro. Utilice como protección de manos: Guantes de goma impermeables (ej. neopreno, látex). Utilice como protección de ojos: Gafas protectoras. Para manipulación: usar delantal, botas de goma. Para aplicación: usar overol de PVC, botas de goma.

FORMA DE APLICACIÓN:

Dosis de Aplicación: 1 - 2 L/ha en 200 a 400 L de agua, vía foliar.

INCOMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los plaguicidas que se usan comúnmente. En caso de duda hacer una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se conocen síntomas de fitotoxicidad cuando se aplican las dosis recomendadas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO:

Este producto no debe almacenarse ni transportarse con forrajes, alimentos, medicamentos y utensilios de uso personal o pecuario. Manténgase el producto en un lugar fresco y aireado, en su envase original y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y a la luz, no es corrosivo. El producto es estable por un periodo de dos años. **CRECITEC MAX Zn** debe ser almacenado en bodega con rangos de temperaturas entre 5 y 30°C. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, evitando la exposición directa a la luz solar.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

SINTOMAS DE INTOXICACION: No presenta ningún síntoma de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Si el paciente está consciente dé a beber suficiente agua. Busque atención médica inmediata.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente la parte afectada con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MEDICO: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto específico.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN (PROTECCIÓN) AL AMBIENTE: Realice el triple lavado inmediatamente después de vaciar el contenido. Vierta el agua de enjuague en el tanque del equipo de aplicación. Perfore o inutilice los envases después del lavado para evitar su reutilización indebida. Almacene los envases vacíos en un lugar techado, ventilado y alejado de alimentos, agua y forraje. Entregue los envases a centros autorizados para su recolección o disposición final. Nunca los quemé ni los deseche en el campo. Lave los equipos en zonas designadas para este fin, preferiblemente con sistemas de recolección de aguas contaminadas. Evite el vertimiento directo de aguas residuales a fuentes de agua natural o al alcantarillado. No aplique cerca de fuentes de agua, no contamine lagos, ríos o estanques. En caso de derrames recójalos con aserrín o algún material absorbente e incorpórelolo al campo de cultivo.

Titular del registro:

AGRO-CHILE S.A.

PRECAUCIÓN

**¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO.
"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION".
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMESTICOS Y DE LOS ALIMENTOS.
DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO.**

AVISO DE GARANTIA:

El formulador y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. garantizamos el contenido del producto de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado. el usuario asume el riesgo de los daños ocasionados por factores que escapan a la responsabilidad del formulador y adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.