

“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PK3221

# PK3221®

**FERTILIZANTE INORGÁNICO**  
*Aplicación Foliar y Fertirriego*

**Composición:**

Potasio (K<sub>2</sub>O) ..... 21,4% p/p  
Fosforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) ..... 31,5% p/p

**PROCESO DE FABRICACIÓN:** Formulación líquida SL

**CONTENIDO NETO:**

FABRICANTE Y FORMULADOR:



**Anasac Chile S.A.**  
Almirante Pastene 300,  
Providencia. Santiago-Chile.  
Teléfono: (56-2) 24706800

TITULAR DEL REGISTRO:



**AGROCHILE S.A.**  
Valderrama N31-27 y Av. Mariana de  
Jesús, conjunto La Granja Bloque ED  
231 Piso 3 Oficina 31 S. Quito,  
Ecuador. Teléfono: 6020273  
Email: agrochile@anasac.cl

**MODO DE EMPLEO:**

Forma de aplicación: El producto puede ser aplicado vía foliar o fertirriego, mediante el uso de pulverizador terrestre, atomizadoras, nebulizadores u otros dispositivos. Antes de aplicar, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión, deje secarlo y guárdelos. Equipo de aplicación: A pesar que el producto es inocuo y no presenta un peligro para el aplicador deben ser tomadas las precauciones siguientes: Durante el manejo y lavado del equipo de aplicación, se debe utilizar el equipo de protección completo: Pantalón largo, camisa manga larga, botas de hule, mascarilla, protector de ojos y guantes.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Dosis para 200 L de agua.

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Hortalizas	1 a 2 L/ha.	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción	vía foliar o fertirriego
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> ).	1 a 2 L/ha.	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción	vía foliar o fertirriego
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	1 a 2 L/ha.	Aplicar al momento de llenado de grano.	vía foliar o fertirriego
Frutales	1 a 2 L/ha.	3 aplicaciones en épocas de brotación nuevas	vía foliar o fertirriego
Cítricos ( <i>Citrus spp.</i> )	1 a 2 L/ha.	3 aplicaciones en épocas de brotación nuevas	vía foliar o fertirriego
Aguacate ( <i>Persea americana</i> )	1 a 2 L/ha.	3 aplicaciones en épocas de brotación nuevas	vía foliar o fertirriego
Uva ( <i>Vitis vinifera</i> )	1 a 2 L/ha.	2 a 3 aplicaciones desde brotación a cosecha	vía foliar o fertirriego
Cafeto ( <i>Coffea arabica</i> )	1 a 2 L/ha.	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción	vía foliar o fertirriego
Ornamentales	1 a 2 L/ha.	Aplicar cada 20 días en época de receso	vía foliar o fertirriego
Banano ( <i>Musa paradisiaca</i> )	1 a 2 L/ha.	Aplicar desde floración hasta crecimiento de hijo	vía foliar o fertirriego
Cacao ( <i>Theobroma cacao</i> )	1 a 2 L/ha.	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción	vía foliar o fertirriego

“La información presentada sirve como referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”


**PRECAUCIONES:** No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. Puede irritar la piel y los ojos”

**INCOMPATIBILIDAD:** PK 3221® Es incompatible con aceites minerales, compuestos cúpricos y productos muy alcalinos además de dimetoato y dicofol. Además, es incompatible con caldo bordelés. Esperar al menos 20 días entre su aplicación y la de productos con incompatibilidad. En caso de dudas sobre la compatibilidad consulte a ANASAC.



**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR AL: 1800 – VENENO (836366) Atención las 24 horas del día o al Titular del Registro AGROCHILE S.A. Tel: (593)2-6020273 Email: agrochile@anasac.cl**

**N° de REGISTRO** : 2151-F-AGR  
**FECHA DE FORMULACIÓN** :  
**FECHA DE VENCIMIENTO** :  
**LOTE NÚMERO** :  
**P.V.P.** :



[www.anasac.com/international](http://www.anasac.com/international)