PRECAUCIONES

•MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
•NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
•INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
•EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda).

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar delantal, protector facial, guantes y botas. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, máscara con filtro, antiparras, guantes y botas. En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales. Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones que a nivel regional ha establecido la autoridad competente. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA II

CHAMAN FS, es moderadamente tóxico para aves y abejas, aunque debido a su patrón de uso no presenta riesgos para éstas. Prácticamente no toxico para peces.

DESTINO DE LOS ENVASES: LOS ENVASES VACÍOS DEBERÁN SER ENJUAGADOS TRES VECES (TRIPLE LAVADO) Y EL LIQUIDO RESULTANTE AGREGARLO A LA PREPARACIÓN PARA SER PULVERIZADA, PERFORAR EL ENVASE Y ALMACENE EN LUGAR ADECUADO HASTA POSTERIOR RECICLADO.-

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

Antídoto: No posee específico. Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación.
- Solo en caso de una sobredosis y ante niveles séricos de monoetilenglicol superiores a 200 µg/L, administrar alcohol etílico al 5% iv (2 a 3 L en 12 a 18 h), manteniendo una alcoholemia de 0,1 a 0,15% (se satura la capacidad metabólica hepática y renal, evitando o disminuyendo la biotransformación a sus metabolitos tóxicos).

Primeros auxilios: En caso de ingestión accidental, diluir con mediana cantidad de suero salino. Luego realizar aspiración y lavado gástrico cuidadoso, debido a la presencia de solvente y de un agente tensoactivo. Finalmente administrar 15 g de carbón activado y purgante salino no oleoso (20 g de sulfato de sodio en 500 mL de agua). Procurar asistencia médica de inmediato. Por salpicaduras en piel y ojos, enjuagar con abundante agua limpia. No inducir el vómito.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Llamar al teléfono 021 220-418 del Centro Nacional de Toxicología y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"

Conserve **CHAMAN FS**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad. Por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingredientes Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan a nuestro control el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos de su aplicación y almacenaje.

CHAMAN FS

Fungicida / Insecticida terápico para semillas

Suspensión concentrada para tratamiento de semilla (FS)
Grupo químico: Neonicotinoide / Triazol

CHAMAN FS, actúa como fungicida - insecticida en forma sistémica y por contacto. Este producto no altera el poder germinativo de la semilla.

COMPOSICION:

Imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina ..... 23,3 % p/v
Tebuconazole: (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol .....1,3% p/v
Solventes y coadyuvantes, c.s.p ..... 100 % p/v

REGISTRO SENAVE Nro. : 4336
LIBRE VENTA Nro. : 4291
CONTENIDO NETO :
FECHA DE FABRICACION :
FECHA DE VENCIMIENTO:
LOTE Nro. :

CATEGORIA TOXICOLOGICA II
Registrado en Paraguay por ANASAC PARAGUAY SRL
Reg. SENAVE Nro. A.4-SENAVE 1786 A.7-SENAVE 1786

Importador y Distribuidor en Paraguay:

Fabricante:

anasac

Agrícola Nacional S.A.C e I.
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO -CHILE
Tel: (56-2)4706800

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

INDICACIONES GENERALES:

CHAMAN FS es un terápico para el tratamiento de semillas que actúa simultáneamente como insecticida y fungicida al combinar dos ingredientes activos de acción sistémica (imidacloprid y tebuconazole) otorgando un amplio espectro de acción en un solo tratamiento. Controla tanto enfermedades como insectos de suelo, gusanos alambre e insectos aéreos. Presenta además una adecuada adhesión sobre el grano logrando así evitar el desprendimiento de polvo.

CHAMAN FS es un producto que protege al cultivo durante las etapas de emergencia e implantación, tanto de las enfermedades que se transmiten por semillas como de los insectos (de suelo y aéreos) que atacan al mismo.

INSTRUCCIONES DEL USO:

CULTIVO	PLAGA	ENFERMEDADES	DOSIS (cc/100 kg de semilla)
Trigo	Insectos de suelo: Isocas (*Diloboderus abderus, Cyclocephala signaticollis*) Gorgojos (*Pantomorus sp.*)	Carbon cubierto y volador. (*Tilletia caries, Ustilago Tritici*)	160 – 200
Cebada	Gusanos alambre (Gonoderus sp., Agriotes sp., Discynetus gagates)	Carbon cubierto y volador. (*Ustilago Hordei y U. nuda*)	160 – 200
Avena	Insectos aereos: Pulgones (Shizaphis graminum. Macrosiphum avenae	Carbon volador (*Ustilago avenae*).	160 – 200

EPOCA DE APLICACION: Previo a la siembra.

PREPARACION: La semilla que se destina al tratamiento con **CHAMAN FS** debe ser previamente ventilada para la eliminación de restos vegetales, polvo, etc, y debe tener buena energía y poder germinativo. Poner especial cuidado en la dosificación cuando se inician los tratamientos. Evitar la subdosificación.

MODO DE APLICACION: Diluido en agua.

METODO DE APLICACION: Diluir la dosis indicada en 1,3-1,8 L de agua/ 100kg de semilla. Aplicar con los equipos existentes en plaza para curar semillas en método húmedo. El producto debe quedar homogeneamente distribuido sobre la semilla.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con todos los productos a base de aminoácidos y extractos de algas recomendados para tratamiento de semillas.

FITOTOXICIDAD: CHAMAN FS no afecta el poder germinativo de la semilla.

NOCIVO

v20171121